

SCHEMA di VALUTAZIONE DEL PAZIENTE

Data __/__/____

Cognome _____ Nome _____ Cel./tel. _____

Indirizzo _____ Medico segnalante _____

Barrare le condizioni rilevate

<p>1 - <input type="checkbox"/> febbre <input type="checkbox"/> febbre > 38,6°C <input type="checkbox"/> storia di febbre nelle ultime 24 ore</p> <p><input type="checkbox"/> mal di testa intenso</p> <p><input type="checkbox"/> vomito, diarrea, dolore addominale</p> <p><input type="checkbox"/> manifestazioni emorragiche di vario tipo non spiegabili</p> <p><input type="checkbox"/> insufficienza multiorgano</p> <p><input type="checkbox"/> una persona deceduta improvvisamente ed inspiegabilmente.</p> <p>2 - <input type="checkbox"/> Proveniente da <u>zone</u> in cui è presente l'epidemia di Ebola</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Sierra Leone (intero paese) <input type="radio"/> Liberia (intero paese) <input type="radio"/> Guinea (intero paese) <p>3 - <input type="checkbox"/> Sono trascorsi meno di 21 giorni da quando ha lasciato il Paese</p>	<p>Se</p> <p>febbre + 1 altro sintomo</p> <p>è sufficiente anche solo</p> <p>1 sintomo (compresa la febbre di qualsiasi grado) + alto rischio di esposizione (questa condizione si applica solo se rilevabile con sufficiente attendibilità)</p> <p>+</p> <p>Criteria 2 e 3</p> <p>CASO SOSPETTO</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p>
<p>ALTO RISCHIO DI ESPOSIZIONE: UNO DEI SEGUENTI (devono essere rilevabili con sufficiente attendibilità)</p> <p><input type="checkbox"/> Contatto faccia a faccia (ad esempio, a meno di 1 metro di distanza) senza indossare appropriati dispositivi di protezione individuale (inclusi quelli per la protezione oculare) con un caso probabile o confermato che presenti tosse, vomito, emorragia, o diarrea. Contatto sessuale non protetto con una persona precedentemente ammalata, fino a tre mesi dopo la guarigione;</p> <p><input type="checkbox"/> Contatto diretto con qualunque materiale contaminato da fluidi corporei di un caso probabile o confermato;</p> <p><input type="checkbox"/> Esposizione della cute (ad esempio, per puntura accidentale) o delle mucose a sangue, altri liquidi biologici, campioni di tessuto o di laboratorio di un caso probabile o confermato;</p> <p><input type="checkbox"/> Partecipazione a riti funerali con esposizione diretta alla salma nelle aree geografiche (o proveniente dalle aree geografiche) affette, senza appropriati dispositivi di protezione individuale;</p> <p><input type="checkbox"/> Contatto diretto con pipistrelli, roditori, primati, vivi o morti, nelle zone (o proveniente dalle zone) affette o con carne di animali selvatici ("bushmeat").</p>	<p>Se</p> <p>febbre + 1 altro sintomo</p> <p>+</p> <p>alto rischio di esposizione</p> <p>+</p> <p>Criteria 2 e 3</p> <p>CASO PROBABILE</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p>

**Livello del rischio di trasmissione del virus Ebola secondo il TIPO di CONTATTO
con PAZIENTE INFETTO**
(circolare Ministero della salute 06/10/2014)

CONTATTO	ESEMPIO	TIPO di contatto	RISCHIO
<p>Personale che hanno condiviso spazi confinati con il caso, senza contatto diretto con sangue o materiali biologici.</p> <p>Personale sanitario che ha gestito un caso adeguatamente protetto o ha manipolato campioni biologici con le adeguate protezioni.</p>	<p>Aver viaggiato con lo stesso mezzo di trasporto, avere soggiornato nello stesso albergo, ecc.)</p>	Casuale	Basso rischio
<p>Si considerano contatti a medio rischio i conviventi; coloro che hanno assistito un caso probabile o confermato, o lo hanno toccato senza venire a contatto visibile con fluidi corporei, o ne hanno toccato gli abiti, o hanno manipolato campioni biologici, senza le dovute protezioni.</p>	<p>visita medica, misurazione della temperatura o della pressione sanguigna</p>	Contatti stretti "media intensità"	Rischio intermedio
<p>Esposizione diretta di cute (anche integra) o mucose a materiali biologici del paziente senza adeguata protezione.</p>	<p>sangue, vomito, secrezioni respiratorie, feci, urine; contatto viso a viso, rapporto sessuale, punture o altre ferite penetranti con materiale potenzialmente contaminato, manipolazione e ricomposizione della salma,.</p>	Contatti stretti ad "alto rischio"	Rischio elevato

CHI	RISCHIO
Rischio che un turista si infetti durante un viaggio in un Paese affetto e sviluppi la patologia una volta rientrato in EU.	Il rischio è considerato estremamente basso , anche nel caso in cui il viaggio avvenga in località in cui si sono verificati i casi primari. Il contatto diretto con organi e secrezioni biologiche di soggetti/animali infetti (vivi o morti) è considerato improbabile per un turista medio.
Rischio che un viaggiatore si infetti durante una visita ad amici e familiari nei Paesi affetti.	Il rischio è considerato basso a meno che non vi sia un contatto diretto con organi e secrezioni biologiche di soggetti/ animali infetti (vivi o morti). In questo caso, la ricerca attiva dei contatti dovrebbe consentire l'identificazione dell'esposizione e prevenire l'ulteriore diffusione dell'infezione.
Rischi per cittadini europei residenti in Paesi affetti	Il rischio è considerato molto basso , tranne nel caso di un contatto diretto con organi e secrezioni biologiche di soggetti/ animali infetti (vivi o morti). Esiste un rischio di trasmissione in caso di rapporti sessuali non protetti con un paziente EVD in fase di convalescenza.
Rischio per gli operatori sanitari in Paesi affetti	Esiste un rischio specifico per gli operatori sanitari e volontari che operino presso servizi sanitari nei paesi affetti, in particolare se coinvolti nell'assistenza a pazienti affetti da EVD. L'applicazione delle precauzioni raccomandate dovrebbe efficacemente prevenire la trasmissione
Campioni inviati a laboratori EU	Esiste un rischio teorico in caso di mancata applicazione dei regolamenti e delle precauzioni previste per il trasporto di campioni possibilmente infetti.