UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

UO Igiene e
Sanità Pubblica

Meningiti: la situazione epidemiologica

Vincenzo Baldo

Meningiti batteriche

	<i>Haemophilus influenzae</i>	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	<i>Neisseria meningitidis</i>
Cell wall	Gram negative	Gram positive	Gram negative
Capsular types	6 capsular types (a-f) Capsular type b in >90% Other capsular types can cause meningitis, especially type a; unencapsulated rarely	>90 capsular types Prominent serotype variation; by region, time period, and invasive potential Wide distribution of serotypes with high incidence	12 serogroups Most disease due to 6 serogroups (A, B, C, W135, X, Y) Unencapsulated meningococci predominate in carriage
Laboratory detection	Fastidious requires specific culture media Specialised laboratory facilities required for capsular typing	Fastidious requires specific culture media Specialised laboratory facilities required for serotyping	Fastidious requires specific media and very rapid processing Molecular methods have greatly enhanced detection
Colonisation vs disease	Carriage 3-5% in high-income countries, 2 to 3 times higher in settings with high incidence of invasive disease	Carriage increases steeply in early infancy in low-income settings, later increase elsewhere Up to 90% of infants <2 years are carriers; serotypes differ from those causing disease	Carriage varies from 8% to 25% Short carriage duration before invasive disease well documented
Case severity	Meningitis more severe than other focal infections; in low-income countries pneumonia accounts for more severe infections than meningitis	Meningitis more severe than other focal infections	Sepsis and hypotension more severe than meningitis
Meningitis as a proportion of invasive disease	50%; higher where blood cultures not taken or unavailable	10%; higher where blood cultures not taken or unavailable and lower in adults	Higher in epidemic settings and with serogroup A
Age distribution	90% <5 years Age distribution shifted towards infants in high-incidence settings	Highest incidence <2 years and >75 years Age distribution shifted towards infants in high-incidence settings	Peaks in infants and adolescents Age distribution varies by serogroup and in epidemics
Epidemic potential	Intrahousehold transmission, no community epidemics	Epidemics in closed settings (high-income countries); community outbreaks in Africa—predominantly type 1	Epidemics documented with all serogroups, especially serogroup A, also W135 and B

Table 1: Microbiological and epidemiological characteristics of *Haemophilus influenzae*, *Streptococcus pneumoniae*, and *Neisseria meningitidis* as causes of acute bacterial meningitis

Malattie infettive: prevenibilità

Malattia	Tasso di letalità	Note
Ebola ¹	50%–89%	
H5N1 (influenza aviaria)	59%	Casi riportati in Africa e Asia
Vaiolo	≥30%	Considerato eradicato nel1980
Malattia meningococcica invasiva	9%–12%	A dispetto di appropriato trattamento antibiotico
Difterite ⁴	5%–10%	
Pneumococcal pneumonia ⁴	5%–7%	
Polio paralitica ⁴	2%–5%	
Meningite da Hib ⁴	2%–5%	
Varicella ⁴	<1%	Bambini e adolescenti
Morbillo ⁴	0.2%	United States, 1985–1992
Rotavirus ⁵	0.01%	US

La rapida progressione della malattia meningococcica

Evoluzione temporale del quadro clinico dall'esordio

Sintomi precoci (4-8 ore)	Sintomi classici (12-15 ore)	Sintomi terminali (15~24 ore)
<ul style="list-style-type: none">▪ Irritabilità▪ Inappetenza▪ Febbre▪ Nausea▪ Mal di gola	<ul style="list-style-type: none">▪ Rash emorragico▪ Meningismo▪ Fotofobia	<ul style="list-style-type: none">▪ Confusione/delirio▪ Convulsioni▪ Perdita di coscienza▪ Shock settico▪ Possibile decesso

**Ricovero in ospedale
(tempo medio di ~ 19 ore)**

Natura della malattia

- Colpisce principalmente i bambini e gli adolescenti

- La malattia è **letale nel 5-10%** dei casi anche con trattamento antibiotico
- Tra gli individui che sopravvivono, **fino al 20% ha sequele** neurologiche permanenti
- La **setticemia meningococcica** è una forma meno comune di malattia meningococcica ed è caratterizzata da un alto tasso di mortalità.

Neisseria meningitidis

Sierogruppo

13 **sierogruppi** identificati sulla base del polisaccaride capsulare

5 **sierogruppi** causano la maggior parte dei casi di malattia

Sierotipo e sierosottotipo

Identificati sulla base delle proteine della membrana esterna incluse le proteine porine di classe 2 e 3 (*porB*) e la proteina porina di classe 1 (*porA*)

Immunotipo

Identificato sulla base dei **lipooligosaccaridi**

I sierogruppi di *Neisseria meningitidis* hanno una diversa distribuzione a livello globale

1. Public Health Agency of Canada. *Canada Communicable Disease Report (CCDR)*. June 2007;33:1-15; 2. CDC. Active Bacterial Core Surveillance Report, Emerging Infections Program Network, *Neisseria meningitidis*, 2005; 3. Informe Regional de SIREVA II. Organizacion de Panamericana de la Salud; 2007; 4. Ciccone FH, et al. *BEPA*. 2006;3:7-12; 5. Chiavetta L, et al. *Revista Argentina de Microbiologia*. 2007;39:21-27; 6. EU-IBIS Network. Serogroup analysis: 2006. www.euibis.org; 7. Nicolas P, et al. *J Clin Microbiol*. 2005;43:5129-5135; 8. Coulson GB, et al; Group for Enteric, Respiratory and Meningeal Disease Surveillance in South Africa. *Emerg Infect Dis*. 2007;13:273-281; 9. Chiou CS, et al. *BMC Infect Dis*. 2006;6:25; 10. Takahashi H, et al. *J Med Microbiol*. 2004;53:657-662; 11. Australian Meningococcal Surveillance Programme. *CDF*. 2007;31:185-193; 12. Martin D, et al. Wellington, New Zealand: Ministry of Health; 2006.

Cintura della meningite nell'Africa subsahariana

**Trends of epidemic meningitis cases
In the African Belt
countries, 1994–2014**

Data source: WHO

6,173 samples have been collected out of 21,051 suspected cases (29.3%).

65.3% of these samples tested negative by the laboratory.

The NmC has become the predominant pathogen with 37.3% of positive samples, followed by Sp 26.5%; NmX 14.1% and NmW 9.8% of positive samples.

The proportion of NmX reported by 6 countries is increasing (3rd position)

Pays	Cas	Décès	Létalité (%)
Country	Cases	Deaths	CFR (%)
Benin^P	451	42	9.3
Burkina Faso^T	1 607	134	8.3
Cameroun ^P	582	36	6.2
Centrafrique^P	190	17	8.9
Côte d'Ivoire^P	83	4	4.8
Ethiopia^T	682	9	1.3
Ghana ^P	753	72	9.6
Guinea^P	151	4	2.6
Guinée Bissau	0	0	0.0
Gambia^T	27	3	11.1
Kenya	105	5	4.8
Mali^T	160	1	0.6
Mauritania^P	1	0	0.0
Niger^T	3231	187	5.8
Nigeria^P	9348	592	6.3
RD Congo**	2 775	236	8.5
Senegal ^P	87	0	0.0
Sierra Leone	0	0	0.0
South Sudan ^P	23	3	13.0
Sudan^T	47	1	2.1
Tanzania	0	0	0.0
Tchad^T	174	15	8.6
Togo^P	493	34	6.9
Uganda ^P	81	19	23.5
Total	21 051	1 414	6.7

Comments :

A cumulative total of 21, 051 suspected cases with 1,414 deaths (CFR of 6.7%) have been notified in 2017.

Countries are invited to improve the completeness of data and timeliness of data sharing.

Meningococcal Incidence by Serogroup and Age-Group, 2006-2015

SOURCE: CDC; National Notifiable Diseases Surveillance System with additional serogroup data from Active Bacterial Core surveillance and state health departments.

Unknown serogroup (20%) and other serogroups (5%) excluded

In Europa dati 2015 (ECDC modificato)

Serogroup	Cases	%
B	1682	53,9
C	403	12,9
Y	290	9,3
W	317	10,2
Other /not identified	429	13,7
Total	3121	100

- In 2015, **3121** invasive meningococcal disease were reported
- The notification rate was **0.6 cases per 100 000 population**
- Age-specific rates were highest in infants (**9,95 cases per 100 000**)
- The majority of cases were **caused by serogroup B**

Meningococcal B in Inghilterra

Recommended immunisation schedule

2, 4 and 12 months (2+1)

If second routine primary immunisation appointment due on or after 1st

September then follow this schedule:

3, 4 and 12 months (2+1)

If third routine primary immunisation appointment due on or after 1st

September then follow this schedule:

4 and 12 months (1+1)

Effectiveness and impact of a reduced infant schedule of 4CMenB vaccine against group B meningococcal disease in England: a national observational cohort study

[Lancet Volume 388, No. 10061](#), p2775–2782, 3 December 2016

Interpretation

The two-dose 4CMenB priming schedule was highly effective in preventing MenB disease in infants. **Cases in vaccine-eligible infants halved in the first 10 months of the programme.** While ongoing national surveillance will continue to monitor the longer-term impact of the programme, these findings represent a step forward in the battle against meningococcal disease and will help reassure that the vaccine protects against this deadly infection.

Number of Cases

Public Health
England

Health Protection Report
weekly report

Infection report

Volume 11 Number 13 Published on: 31 March 2017

Preliminary vaccine coverage estimates for the new meningococcal B (MenB) immunisation programme for England, update to the end of February 2017

Preliminary vaccine coverage estimates for the infant Meningococcal B immunisation, evaluated at the end of February 2017, are 96.8% for one dose and 87.9% for two doses by six months of age. Children who were 12 months in February achieved 96.3% coverage for one dose and 93.1% for two doses.

The first cohort routinely offered the vaccine that reached 18 months of age in February achieved 95.8% coverage for one dose, 93.5% for two doses and 87.9% for the booster dose.

Figure 1. Monthly Meningococcal B vaccine coverage evaluated at six months of age for one dose and two doses, and the percentage of GP practices reporting: England, November 2015 to February 2017*

Epidemiologia in Italia: Casi di meningococco 2001-2016

Complessivamente circa il 35% delle Neisserie è di tipo C

Incidenza e distribuzione N. meningitidis nelle diverse fasce di età (2011-2016)

Il cluster di meningiti in Toscana anno 2015-17

82 casi

Età media: 35 anni

Incidenza di infezione meningococcica nelle diverse regioni Italiane (casi x 100.000) anno 2014

Pensiamoci prima di dire che in Toscana c'è un'epidemia.....
La Toscana non è dissimile dalle altre regioni

I casi si trovano....se si cercano!

Meningite in Toscana, eccessi di casi di meningococco C. Rezza (Iss): "Ceppo particolarmente virulento"

Complesso clonale ST-11

- Utilizzando l'analisi delle sequenze mediante multilocus sequence typing (MLST) é stato, inoltre, tipizzato il complesso clonale ST-11 del meningococco C nella maggior parte dei campioni inviati, che presenta particolare virulenza e contagiosità ed é associato ad una patologia precocemente generalizzata e con un'elevata frequenza di complicanze.
- Clusters di malattia invasiva causati da N. meningitidis di gruppo C con complesso ST-11 sono stati rilevati in Germania e Francia. In Nord Italia tra dicembre 2007 e luglio 2008, sono stati riportati 2 clusters dovuti a meningococco C ST- 11, con alto tasso di letalità e complicanze.

Serogroup C Meningococcal Glycoconjugate Vaccine in Adolescents: Persistence of Bactericidal Antibodies and Kinetics of the Immune Response to a Booster Vaccine More Than 3 Years after Immunization

Snape MD et al. *Clinical Infectious Diseases* 2006; 43:1387–94

Conclusions. This study showed sustained levels of bactericidal antibodies for at least 3 years after immunization of adolescents with MenCV. After challenge of immunized adolescents with MenPS, there was no increase in serum bactericidal assay observed until day 5 after vaccination, indicating that immunological memory may be too slow to generate protection against this potentially rapidly invasive organism.

La memoria immunologica è presente.

La risposta booster si verifica nel tempo previsto (5-8 gg)

La risposta al MenPS mima l'infezione naturale

La meningite/sepsi meningococcica non ci consente di aspettare 5 giorni !!!

Flussi informativi presenti nella regione Veneto

- Flusso di **sorveglianza nazionale** delle malattie batteriche invasive
- Flusso afferente al sistema informatizzato malattie infettive **SIMI-WEB**
- Flusso basato sulle **microbiologie** (avviato all'inizio del **2007**)
- [Schede di dimissione ospedaliera (**SDO**)]

Periodo in studio 2007-2016

Sistema Sorveglianza Regione Veneto

MIB - Flussi informativi presenti

Numero assoluto notifiche per malattie batteriche invasive nella Regione Veneto 1994-2016

* dall'anno 2007 è attiva la sorveglianza basata sui Laboratori di Microbiologia.

Distribuzione assoluta dei casi notificati per *Neisseria meningitidis* per classe di età, Regione Veneto (2007-2016)

- Nel periodo 2007-2016 (**10 anni di osservazione**) attraverso tutti i flussi di sorveglianza, sono stati notificati complessivamente **176 (circa 18 casi all'anno)** casi di patologia correlata ad infezione da *Neisseria meningitidis*
- Tasso di notifica medio **0,4 per 100.000 abitanti**

Tipizzazione *Neisseria meningitidis* per anno, Regione Veneto (2007-2015)

- **176 soggetti totali**
- riduzione dei ceppi isolati con sierogruppo C
- aumento percentuale nel tempo dei ceppi A, Y, W

Tasso di notifica per *Neisseria meningitidis* per classe di età e per sierogruppo Regione Veneto (2007-2016)

- Maggiore incidenza **nei soggetti con età inferiore all'anno di età** (6,5 per 100.000 abitanti).
- Sotto l'anno di età **il 72,7% dei casi sono attribuibili al meningococco tipo B** (16 casi su 23 totali) tasso specifico per il **ceppo B pari a 3,7 per 100.000 abitanti**;
- **Nella classe di età 01-04 anni** (2,4 casi per 100.000 con un tasso specifico per **meningococco B di 1,7 per 100.000 abitanti**)

Casi notificati per *Neisseria meningitidis* tipo B per classe di età e esito, Regione Veneto (2007-2016)

24 decessi nel periodo, letalità pari a 13,5%, di cui 12 casi da MenB

Numero assoluto e percentuale delle notifiche e concordanza tra i tre flussi (2007-2014)

145 casi

Analisi cattura-ricattura

[(criteri Akaike (AIC) e sul criterio di Bayes (BIC)]

Modello	DoF	G2	p-value	AIC	BIC	X [^]	N [^]	95%CI
A B C	3	4,43	0,22	-1,57	-1,41	0	145	145-148

Il modello stima 146 casi totali (95%CI: 145-152)

A B C (AB) (AC)	5	0,1	0,76	-1,9	-1,85	2	147	145-159
A B C (AB) (BC)	5	0,31	0,58	-1,69	-1,64	1	146	145-154
A B C (AC) (BC)	5	4,42	0,04	2,42	2,48	0	145	145-149
A B C (AB) (AC) (BC)	6	0	1	0	0	2	147	145-167

A: Mandatory Notification System; B: National Surveillance System ; C= Laboratories Surveillance System; G2: likelihood ratio statistic; AIC: Akaike Information Criterion; BIC: Bayesian Information Criterion; x[^]: estimated total cases not reported; N[^]: estimated total cases.

La sensibilità è del **99,3%** (95%CI: 95,4%-100%).

La completezza

- **SIMI è del 91,1%** (95%CI: 87,6%-91,7%).
- **MIB è del 83,5%** (95%CI: 80,3%-84,1%).
- **SSM è del 71,2%** (95%CI: 68,43%-71,7%).

Tipizzati: 79,3% del totale degli isolati (2007-2014)

- tipizzati dall'SSM è il **94,2%**;
- altri due flussi (SIMI, MIB) è il **41,4%**

Linkage dati flusso delle SDO

- Ricerca codice ICD 9-CM 036.xx
 - Il numero di casi estratti: **146**

Analisi cattura-ricattura (Chao)

Il modello stima 189 casi (95%CI: 181-197)

La sensibilità è del **94,7%** (95%CI: 90,8%-98,8%)

La completezza

- **SIMI+MIB+SSM: 76,7%** (95%CI: 73,6%-80,1%)
- **SDO: 77,2%** (95%CI: 74,1%-80,6%).

179 casi totali nel periodo 2007-2014

**I casi notificati esclusivamente nel sistema SIMIWEB-MIB-SSM incrociano con SDO con diagnosi di dimissione
NON per meningite meningococcica**

Tasso di notifica per malattie batteriche invasive da meningococco nella Regione Veneto (1994-2016)

42 casi in più nel periodo 2007-2016

Streptococcus pneumoniae

Serotype 19F; Photograph by Rob Smith (Wyeth)

- Si osserva in coppie (diplococchi) o in piccole catene
 - L'identificazione tipo-specifico è basata sulla capsula polisaccaridica che circonda la parete cellulare
- 91 (siero)tipi finora identificati sulla base della loro reazione a specifici anti sieri
 - Anticorpi opsonizzanti
 - sono protettivi
 - tipo-specifici
 - I 10 più comuni sierotipi sono responsabili di circa il 62% delle patologie invasive

Tasso di IPD (per 100.000) in Europa

- **21.118** casi in Europa nel 2015
- Tasso del **5,58 per 100,000** abitanti
- **Range 0,27-16,9** per 100,000 della popolazione europea, con oscillazioni significative da regione a regione
- CFR del **14,9%**
- **Sistemi di sorveglianza eterogenei**

Distribuzione del numero di casi di Streptococcus pneumoniae per classe di età, Regione Veneto 2007-2016

Nel periodo 2007-2016, attraverso **i tre flussi di sorveglianza**, sono stati notificati complessivamente **1.554 casi** di patologia correlata ad infezione da ***Streptococcus pneumoniae***.

Andamento temporale delle MBI da Streptococco pneumoniae Regione Veneto (2007-2016)

Il tasso di notifica nel periodo è pari complessivamente a **3,2
per 100.000 abitanti**

Tasso di notifica (x100.000 abitanti) per MBI da Streptococco pneumoniae per anno e valenza vaccinale, Regione Veneto (2007-2016)

1554
casì notificati

766 (49,6%)
ceppi tipizzati

Distribuzione assoluta dei sierotipi di *Streptococcus pneumoniae* per classe di età, Regione Veneto (2007-2016)

Sierotipi	%
non vaccinali (NO-PCV13)	57,4
sierotipi 13 valente	42,6

sierotipo	%
3	15,0
19A	8,0
1	7,7
7F	6,2
6A	4,3
5	1,2

Casi notificati per Streptococco pneumoniae per classe di età, per esito Regione Veneto (2007-2016)

124 decessi totali, letalità pari a 8,0%, di cui:

Pneumococcal Conjugated Vaccine Reduces the High Mortality for Community-Acquired Pneumonia in the Elderly: an Italian Regional Experience

Table 3. Characteristics of the study population by pneumococcal vaccination status.

Variables	Pneumococcal vaccination status					
	Not vaccinated		PPV23		PCV13	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)
Gender [n(%)]						
Males	1,577	(48.7)	293	(50.3)	107	(51.9)
Females	1,664	(51.3)	290	(49.7)	99	(48.1)
Age groups [n(%)]						
65–69	112	(3.5)	29	(5.0)	3	(1.5)
70–74	339	(10.5)	87	(14.9)	21	(10.2)
75–79	479	(14.8)	96	(16.5)	34	(16.5)
80–84	643	(19.8)	91	(15.6)	41	(19.9)
85+	1,668	(51.5)	260	(48.0)	107	(51.9)
At least one comorbidity [n(%)]						
Asthma	1,253	(38.7)	235	(40.3)	94	(45.6)
COPD	583	(18.0)	116	(19.9)	48	(23.3)
Chronic heart diseases	1,237	(38.2)	233	(40.0)	78	(37.9)
Diabetes	792	(24.4)	162	(27.8)	56	(27.2)
Malignant neoplasms	518	(16.0)	99	(17.0)	30	(14.6)
All-cause mortality						
in-hospital	803	(24.8)	133	(22.8)	36	(17.5)
at 30 days	262	(8.7)	52	(8.9)	14	(6.8)
at 1 year	772	(23.8)	147	(25.2)	52	(25.2)
cumulative	1,857	(57.3)	332	(56.9)	102	(49.5)

Mortality rate (%) by cause of death and pneumococcal vaccination status

Table 1. Standardized mortality rates (SMR) by gender and time of death.

Time of death	Male		Female		Total	
	SMR	95% CI	SMR	95% CI	SMR	95% CI
In-hospital mortality	3.01	5.22–6.24	2.66	2.42–2.89	2.86	2.68–3.04
30-day mortality	2.24	1.92–2.59	2.19	1.89–2.54	2.25	2.02–2.49
1-year mortality	1.73	1.58–1.88	1.65	1.51–1.81	1.73	1.62–1.83
Cumulative mortality	2.20	2.07–2.32	2.07	1.95–2.19	2.17	2.08–2.26

Conclusions

The results of the present study confirm a higher mortality rate among elderly people hospitalized for pneumonia and suggest a protective role for PCV13 vaccination. Long-term studies are needed, however, to confirm the benefit of PCV13 in reducing pneumonia-related mortality in the elderly. Meanwhile, efforts should be made to improve vaccination programs for the elderly, given the higher frequency of chronic diseases in this population.

Grazie per l'attenzione!!!